

## **ТОПАМАКС – ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

### **ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И УПАКОВКА**

Капсулы по 50 мг №60.

### **СОСТАВ**

1 капсула содержит топирамата 50 мг.

### **ПОКАЗАНИЯ**

Топамакс - противоэпилептический препарат. Топамакс относится к группе противосудорожных средств, которые блокируют натриевые рецепторы, останавливают нервное возбуждение и снимают спазмы. Препарат повышает активность ГАМК-рецепторов и нормализует действие АМПК-рецепторов. Применяется для лечения эпилепсии на начальной стадии, мигрени и спазматических состояний различной этиологии. Топамакс оказывает противоспазматическое, анальгетическое и противовоспалительное действие.

*Показания к применению:* парциальные или генерализованные тонико-клонические припадки у взрослых и детей старше 2 лет (в качестве монотерапии или в комбинации с другими противосудорожными средствами); припадки, связанные с синдромом Леннокса-Гасто, у взрослых и детей старше 2 лет (в качестве средства дополнительной терапии); как вспомогательное лекарственное средство для устранения спазмов гладкой мускулатуры мышц.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ**

Топамакс при эпилептических приступах следует принимать внутрь по 200 мг 2 раза в сутки. При необходимости можно смешивать содержимое капсулы с небольшим количеством воды. Взрослые пациенты могут принимать Топамакс совместно с другими противосудорожными препаратами. Дозировка должна устанавливаться лечащим врачом. На начальной стадии эпилепсии начинать с 25 мг в сутки и постепенно увеличивать дозировку. Повышение дозировки зависит от клинических показаний пациента. Детям с 2 до 10 лет дозировка не должна превышать 50 мг в сутки. В качестве дополнительного противоэпилептического средства Топамакс необходимо принимать по 9 мг 2 раза в сутки. Курс лечения - 7 дней. При мигрени назначают по 100 мг 2 раза в сутки. При сильных приступах мигрени дозировка повышается до 200 мг 2 раза в сутки. Для профилактики пациент должен принимать препарат в течение 1 недели по 25 мг 1 раз в сутки (перед сном).

### **ПЕРЕДОЗИРОВКА**

При передозировке возможно усиление проявлений побочных эффектов. Лечение симптоматическое.

### **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ**

Применение препарата Топамакс при беременности возможно только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При необходимости применения Топамакса в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

### **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ**

При применении Топамакса возможны диарея, рвота, тошнота, потеря веса, снижение аппетита; спутанность сознания, головная боль, головокружение, сонливость, повышенная утомляемость, депрессия, галлюцинации, тревожность; снижение зрения, миопия, гиперемия слизистой оболочки глаз, мидриаз, повышение внутриглазного давления; крапивница, зуд, воспаление слизистых оболочек, отек Квинке, дерматит.

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Топамакс противопоказан при беременности и лактации; детям до 2 лет; при повышенной чувствительности к компонентам препарата, печеночной недостаточности, тяжелых заболеваниях головного мозга, сердечной недостаточности, злокачественных опухолях.

С осторожностью препарат назначают при нефроуролитиазе, почечной недостаточности, остеопорозе и в пожилом возрасте.

### **ОСОБЕННЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Отменять Топамакс следует постепенно, чтобы свести к минимуму возможность повышения частоты припадков.

При применении Топамакса может повышаться риск образования камней в почках и появления связанных с этим симптомов. Для уменьшения риска развития нефролитиаза следует увеличить объем потребляемой жидкости.

Если на фоне приема препарата Топамакс у пациента уменьшается масса тела, то следует скорректировать режим питания.

Пациентам, принимающим Топамакс, следует воздерживаться от употребления алкоголя.

В период терапии Топамаксом не рекомендуют применять другие препараты, оказывающие угнетающее действие на ЦНС.

Во время лечения пациентам, управляющим транспортными средствами и занимающимися деятельностью на опасных объектах, необходимо соблюдать осторожность.

### **СРОК ГОДНОСТИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 3 года.

### **КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА**

По рецепту.

**САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ.  
ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.**